

# ÁLLATTARTÓK FIGYELMÉBE

## Ismerje fel a ragadós száj- és körömfájás betegségét

AZ RSZKF ELSŐSORBAN A SERTÉSEKET, A SZARVASMARHÁKAT ÉS A KISKÉRŐDZŐKET ÉRINTI

### KLINIKAI TÜNETEK:

- Vetélés és az újszülöttek hirtelen elhullása
- Étvágytalanság
- Depresszió
- Láz
- Sántaság
- Csökkent tejtermelés
- Nyáladás
- Hólyagok és sebek

### A BETEGSÉG FELISMERÉSE:

- Elváltozások az interdigitális területeken, ami gyakran sántasággal párosul.
- Fokozott nyáladás és a szájat érintő elváltozások jelentkeznek.
- A juhokban és a kecskében a klinikai tünetek gyakran enyhék és nehezebben észrevehetők.

### HOGYAN TERJED?

- Az állatok közötti közvetlen érintkezéssel | A leggyakoribb átviteli út.
- Állati termékekkel | A második leggyakoribb átviteli út a fogékony fajok esetében a fertőzött takarmány, állati termékek lenyelése, például kezeletlen nyers tej adása fiatal állatoknak.
- Mechanikai átvittel | Egyéb átviteli út lehet a vírus mechanikai átvitele, például lábbelin, ruházaton, állatorvosi műszereken vagy járműveken.
- A széllel | A széllel történő átvitel nem gyakori, de lehetséges, különösen nagy sertéstelepek közelében, bizonyos időjárási viszonyok között (hűvös hőmérséklet és magasabb páratartalom).

## FONTOS!

**Ha felmerül a ragadós száj- és körömfájás gyanúja, a lehető leghamarabb értesítse a helyi hatóságot vagy a szolgáltató állatorvost.**

# ÁLLATTARTÓK FIGYELMÉBE

## Teendők ragadós száj- és körömfájás megelőzéséhez

A ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) rendkívül fertőző betegség, amely a párosujjú patás állatokat (elsősorban szarvasmarha, sertés, juh, kecske; vadon élő fajok közül őz, gím- és dámszarvas, muflon, vaddisznó) érinti.

Terjesztésében a legnagyobb szerepe az élőállatok közötti közvetlen érintkezésnek van, de a betegség könnyen terjed állati termékekkel, és ragályfogó tárgyak vagy személyek útján is. Fontos, hogy az állattartók szigorúan és következetesen betartsanak minden állategészségügyi szabályt és járványvédelmi előírást:

- Csak olyan személy lépjen be az állatok tartási helyére, akinek a jelenléte valamilyen okból ott nélkülözhetetlen.
- Az állattartó telepre be-és kihajtó minden járművet alaposan fertőtlenítsenek.
- Viseljen mindig tiszta munkaruhát, lábbelit, ha az állatai közelébe megy.
- Tisztítsa rendszeresen az állatgondozáshoz használt eszközöket, szerszámokat, munkagépeket, és ne adja kölcsön azokat más állattartónak.
- Ne használjon fel más állattartó telepről származó takarmányt, almot vagy szerszámot, azokat ne is vigye be a gazdaságába.
- Az állattartó telepet megfelelően kerítsék körül, hogy megakadályozzák az állatok vadon élő fogékony állatokkal való közvetlen érintkezését.

Tájékozódjon hiteles forrásból! A járvány alakulásáról, a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról naprakész információkat olvashat a Nébih ragadós száj- és körömfájás tematikus oldalán: [portal.nebih.gov.hu/rsz kf](http://portal.nebih.gov.hu/rsz kf)

### **FONTOS!**

**Ha felmerül a ragadós száj- és körömfájás gyanúja, a lehető leghamarabb értesítse a helyi hatóságot vagy a szolgáltató állatorvost.**